SFEDP
Société Française d'Endocrinologie et Diabétologie Pédiatrique

rhGH disponibles en France

Laboratoire	Indications	Denomination	Format – Concentration (**incrément** ; dose min-max / injection)	Dispositif d'injection	Reconstitution (poudre)	Conservation avant reconstitution	Conservation après première utilisation	Aiguilles	Cache aiguille optionnel	programme de formation à domicile
Novo Nordisk	GHD, Turner*, IRC, RCIU, Noonan**	Norditropine Flexpro 5	Stylo 5 mg/1,5 ml (**0,025** ; min 0,025 - max 2)	Stylo jetable	non	[+2°C/+8°C]	21 jours à température ambiante	Novofine Plus 4 mm ou Novofine 6 et 8 mm	FlexPro Penmate	oui
		Norditropine Flexpro 10	Stylo 10 mg/1,5 ml (**0.05** ; min 0,05 - max 4)							
		Norditropine Flexpro 15	Stylo 15 mg/1,5 ml (**0.1** ; min 0,1 - max 8)							
Pfizer	GHD, Turner, IRC, RCIU, Prader Willi	Genotonorm GoQuick 5,3	Stylo 5.3 mg/ml (**0.05** ; min 0,2 - max 1.5)	Stylo jetable	oui	[+2°C/+8°C], possibilité 1 mois à température ambiante	28 jours, [+2°C/+8°C]	BD Micro-Fine Ultra 5 ou 8 mm	oui	non
		Genotonorm GoQuick 12	Stylo 12 mg/ml (**0.15** ; min 0,6 - max 4.5)							
		MiniQuick	Seringue unidose - boite de 7 0,6 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2 mg	MiniQuickShell (facultatif)		6 mois à température ambiante	usage unique immédiat après reconstitution	fournies	MiniQuickShell (facultatif)	
Lilly	GHD, Turner, IRC,RCIU, SHOX	Umatrope 6	Cartouche 6 mg/3 ml (bleu) (**0.025** ; min 0,025 - max 1.5)	Humatropen 6 mg (blanc)	oui	[+2°C/+8°C]	28 jours, [+2°C/+8°C]	tout type		oui
		Umatrope 12	Cartouches 12 mg/3 ml (mauve) (**0.05** ; min 0,05 - max 3)	Humatropen 12 mg (vert clair)						
		Umatrope 24	Cartouches 24 mg/3 ml (jaune) (**0,1** ; min 0,1 - max 6)	Humatropen 12 mg (vert foncé)						
Ipsen	GHD, Turner, IRC	NutropinAq	Cartouches 10 mg/2 ml (**0,1**; min 0,1 - max 4)	NutropinAq PEN (à prescrire)	non	[+2°C/+8°C]	28 jours, [+2°C/+8°C]	tout type	oui, actif ou passif	non
Sandoz	GHD, Turner, IRC, RCIU, Prader Willi	Omnitrope 5	Cartouche 5 mg/1,5 ml (**0.05** ; min 0,05 - max 2.7)	SurePal 5 (blanc)	non	[+2°C/+8°C]	28 jours, [+2°C/+8°C]	BD Micro-Fine Ultra 5 ou 8 mm	oui	oui
		Omnitrope 10	Cartouche 10 mg/1,5 ml (**0.1;** min 0,1 - max 5,4)	SurePal 10 (vert)						
		Omnitrope 15	Cartouche 15 mg/1,5 ml (**0.1**; min 0,1 - max 5,4)	SurePal 15 (bleu)						
Merck	GHD, Turner, IRC, RCIU	Saizen 6	Cartouche 6 mg (**0.15** ; min 0,15 - max 4,6)	EASYPOD ou stylo ALUETTA 6 (bleu) / 12 (rouge) / 20 (jaune)	non	[+2°C/+8°C]	28 jours, [+2°C/+8°C], possibilité au maximum 7 jours à température ambiante	fournies (29 ou 31 G (plus fines))	aiguille non visible	oui
		Saizen 12	Cartouche 12 mg (**0.15**; min 0,5 - max 6,4)							
		Saizen 20	Cartouche 20 mg (**0,15**; min 0,5 - max 6,4)							

* 0,0,045 à0,067 mg/kg/j

**0,033 à 0,066 mg/kg/j